

# DuPont™ Acanto® Plus

Fungicid sistemic complex, cu spectru larg de combatere a bolilor foliare la grâu, orz, floarea soarelui și rapiță

Conține: 200 g/l picoxistrobin + 80 g/l ciproconazol.  
Formulare: suspensie concentrată. Ambalat la 5 l

## AVANTAJE

- Produs sistemic cu spectru larg de acțiune: preventiv, curativ și eradicant;
- Acțiune de șoc asupra agenților patogeni;
- Asigură protecție preventivă bună împotriva bolilor pentru creșterile noi;
- Redistribuirea în faza de vapori;
- Protejează partea din frunză care nu a fost pulverizată;
- Zonă de protecție uniformă în jurul plantei tratate;
- Repartiție uniformă la suprafața frunzei (efect de sugativă);
- Reactivarea produsului prin rouă sau ploie;
- Menține cultura verde pentru mai mult timp;
- Stimulează acumularea suplimentară de biomasă;
- Ameliorarea rezistenței la stresul hidric;
- Spor cantitativ și calitativ de producție;
- Amestec "anti - rezistență" prin modul de acțiune diferit al celor două substanțe active.

## MOD DE ACȚIUNE


- Acanto® Plus difuzează translaminar în celulele cuticulare cerate și determină o bună redistribuire a substanței active la suprafața frunzei;
- Acanto® Plus difuzează și translocă în țesuturile neformate înainte ca ele să fie expuse atacului bolilor datorită remobilizării substanței active prin ploaie și rouă;
- Cultura tratată beneficiază de efectul de "înverzire prelungită" specific strobilurilor care determină prin acțiunea anti-oxidantă și intensificarea absorbției azotului, stimularea acumulării suplimentare de biomasă și ameliorarea rezistenței la stresul hidric;
- Picoxistrobinul acționează la nivelul celulei prin blocarea transferului de electroni în "centrala energetică a celulei" mitocondriile.



Distribuirea în faza de vapori



Translocare sistemică



Absorbție rapidă

- Efect rapid în 30-120 minute după aplicarea produsului;
- Proprietatea unică a picoxistrobinului este acțiunea în stare de vapori;
- După absorbție, substanța activă este rapid transportată prin sistemul vascular;
- Ciproconazol acționează sistemic fiind absorbit rapid și translocat acropetal prin xilem în toate părțile verzi ale plantei.

## MOD DE UTILIZARE


- Acanto® Plus este omologat pentru controlul bolilor la culturile de grâu, orz, floarea-soarelui și rapiță.

## SPECTRUL DE BOLI COMBĂTUTE

Cultura	Boli combătute	Doză (l/ha)
Grâu	Făinare ( <i>Erysiphe graminis</i> ) Septorioza ( <i>Septoria spp</i> ) Rugini ( <i>Puccinia spp</i> ) Fuzarioza ( <i>Fusarium spp</i> ) Sfâșierea frunzelor ( <i>Helminthosporium spp</i> )	0,5 l/ha
Orz	Făinare ( <i>Erysiphe graminis</i> ) Pătarea reticulară ( <i>Pyrenophora spp</i> ) Arsura frunzelor ( <i>Rhynchosporium secalae</i> ) Sfâșierea frunzelor ( <i>Helminthosporium spp</i> )	0,5 l/ha
Floarea soarelui	Necrozarea și frângerea tulpinilor ( <i>Phomopsis helianthi</i> ) Putregaiul alb ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ) Putregaiul cenușiu ( <i>Botrytis cinerea</i> ) Alternarioza ( <i>Alternaria spp</i> )	0,6 l/ha
Rapiță	Putregaiul alb ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ) Alternarioza ( <i>Alternaria spp</i> ) Putregaiul uscat ( <i>Phoma lingam</i> ) Făinarea ( <i>Erysiphe spp</i> )	0,6 l/ha

# Acanto®

- Acanto® Plus poate fi aplicat la primul sau al II-lea tratament;
- Pentru a obține producții ridicate și maximum de eficacitate al fungicidului la cereale păioase se recomandă utilizarea Acanto® Plus la al II-lea tratament care trebuie aplicat din faza de burduf până la înflorit;
- În tehnologiile cu un singur tratament Acanto® Plus se recomandă a fi aplicat la apariția primelor simptome ale uneia dintre bolile controlate;
- La floarea-soarelui se recomandă aplicarea în stadiul de 8-10 frunze, la primul tratament sau înainte de înflorit.
- La rapiță, Acanto Plus se aplică în primăvară, după reluarea vegetației până la înflorire.



FUNGICIDE

Extra protecție.  
Extra profit.  
Conțați pe DuPont.

S.C. Andra International SRL  
Valu lui Traian, Jud. Constanța  
Director Cătălin Bocarnea

"Societatea noastră cultivă o suprafață de 3000 de ha, dintre care, în fiecare an cultivăm 1500 ha cu cereale păioase. Acum 3 ani am folosit pentru prima dată fungicidul **Acanto® Plus** la al 2-lea tratament la culturile de grâu și orz, iar culturile noastre s-au menținut verzi aproape 3 săptămâni și am observat un plus de calitate a recoltei și un plus de peste 500-600 kg/ha – (chiar 1000 kg/ha pe solele cele mai bune) la producția medie. De atunci folosesc **Acanto® Plus** și îl an de an. Dintre produsele DuPont mai folosesc fungicidul **Alert®** și erbicidul **Granstar®** la culturile de cereale păioase și erbicidul **Titus® Plus**, la cultura de porumb, toate cu rezultate foarte bune, fapt pentru care le voi folosi în continuare. Concluzia mea este: cu **Acanto® Plus** nu dai greș."

