

DuPont™ Alert®

Fungicid sistemic complex, cu spectru larg de combatere a bolilor foliare la grâu, orz și rapiță

Conține: 125 g/l flusilazol + 250 g/l carbendazim.
Formulare: suspoemulsie. Ambalat la 5 l

FUNGICIDE

AVANTAJE

- Spectru larg de micoze combătute pentru culturile de cereale, floarea soarelui și sfeclă de zahăr;
- Timp îndelungat de acțiune: 4-6 săptămâni de la tratament;
- Protecție garantată - preventiv, curativ, eradicativ;
- Cumularea acțiunii a două substanțe active cu acțiune puternică asupra agenților patogeni, eliminând posibilitatea apariției formelor rezistente;
- Rezistent la spălare după 3 ore din momentul aplicării în câmp;
- Pătrunde rapid și se translocă uniform în țesuturile vegetale;
- Compatibil cu fertilizanți foliari, stimulatori de creștere și de fructificare, etc;
- Efecte pozitive evidente asupra calității și cantității producției;
- Cel mai eficient fungicid în ceea ce privește raportul preț - calitate.

MOD DE ACȚIUNE

Alert® combină modul de acțiune a două substanțe active diferite:

- **Flusilazol** inhibă creșterea ciupercilor prin blocarea biosintezei ergosterolului la nivelul membranei celulare a ciupercii;
- **Flusilazol** are acțiune preventivă și curativă și este ușor translocat în plantă.
- **Carbendazim** afectează diviziunea celulară a patogenului și inhibă formarea hifelor;
- **Flusilazol și carbendazim** au moduri diferite de acțiune și combinarea lor în Alert® reduce substanțial riscul apariției și dezvoltării rezistenței patogenilor.

Atac de boli la grâu



Făinare



Rugină



Septorioză



Fuzarioză la spic

MOD DE UTILIZARE

- Alert® poate fi folosit din toamnă/primăvară până înainte de înflorit în funcție de presiunea de atac.

Cultura	Momentul aplicării	Doză (l/ha)
CEREALE PĂIOASE (grâu și orz)		
Boli foliare și ale spicului		
Făinarea (<i>Erysiphe graminis</i>)	La primul tratament de la sfârșitul înfrățirii până la burduf (BBCH 32-49)	0,8
Rugini (<i>Puccinia spp</i>)		
Septorioze (<i>Septoria spp</i>)		
Sfâșierea frunzelor (<i>Helminthosporium spp</i>)		
Fuzarioza (<i>Fusarium spp</i>)	La al II-lea tratament în faza de burduf - sfârșitul înfloririi (BBCH 60-69)	
Sfâșierea frunzelor (<i>Pyrenophora teres</i>)		
Arsura frunzelor (<i>Rhynchosporium spp</i>)		
RAPIȚĂ		
Putregaiul uscat (<i>Phoma lingam</i>)	De la formarea mugurilor până la formarea silicvelor (BBCH 50-75):	0,8
Putregaiul alb (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	- primul tratament la apariția simptomelor;	
Mucegaiul cenușiu (<i>Botrytis cinerea</i>)	- al II-lea tratament după minim 2-3 săptămâni	
Alternaria (<i>Alternaria brassicae</i>)		
Făinarea (<i>Erysiphe communis</i>)		

- Tratamentul trebuie aplicat cel mai târziu la apariția primelor simptome ale bolilor combătute.
- Alert® poate fi amestecat cu erbicidele Pointer® Ultra, Laren® Pro 20 SG, Granstar® Super, Glean® și Harmony® Extra;
- Pentru utilizarea acestui produs este necesară obținerea autorizării pentru utilizare de produse profesionale clasificate;
- Înainte de aplicarea pe scară largă cu alte produse, se recomandă un test, de amestec pentru controlul compatibilității fizice și selectivității. Nu amestecați Alert® cu insecticide piretroide la tratamentele efectuate în faza de burduf.

Extra protecție.
Extra profit.
Conțați pe DuPont.

S.C Agrofarm S.R.L.
Fetești, jud. Ialomița
Director General Valeanu Laurian

"Holdingul Agrofam cultivă o suprafață de circa 20.000 de ha, dintre care 12.500 ha numai la Agrofam Prod S.R.L., unde am cultivat anul trecut 6.200 ha cu grâu și orz pe care le-am tratat cu **Alert®**, la primul tratament și cu **Acanto® Plus** la al doilea tratament, iar ca erbicid am folosit produsul **Granstar® 75 DF**. Fungicidul **Alert®** l-am aplicat și pe cele 3.000 ha cu rapita pe care le-am cultivat anul trecut. Pot spune ca am obținut rezultate excelente, atât calitativ cât și cantitativ, iar fără aceste produse de la **DuPont™** nu aș fi reușit. De aceea le voi folosi în continuare și le recomand cu plăcere tuturor fermierilor."

