

# DuPont™ Curzate® F

Fungicid sistemic local specializat  
în combaterea manei la vița de vie


Conține: 48g/l cimoxanil + 480g/l folpet.  
Formulare: soluție concentrată. Ambalat la 1 l.

FUNGICIDE

## AVANTAJE

- Cimoxanil este primul fungicid sistemic local pentru combaterea Oomycetelor (manelor);
- Afectează o serie de funcții vitale ale paraziților și nu induce rezistență;
- Combate biotipurile rezistente la fenilamide (metalaxil, benalaxil);
- Partener de amestec și efect sinergic alături de alte fungicide;
- Nu afectează fermentația vinului;
- Induce reacția de hipersensibilitate a plantei prin stimularea unui mecanism specific de rezistență împotriva bolilor, controlat genetic;

## INHIBĂ BOLILE PLANTELOR ÎN DIFERITE MODURI




Inhibă eliberarea zoosporilor  
din sporangiu



Activitate sinergică cu  
produsele de amestec



Stimulează răspunsul  
natural de apărare al  
plantei atacate.



Activ pe suprafața frunzei,  
cât și în interiorul plantei  
înainte și după infecție


Mecanism de acțiune  
complex

# Curzate®

## MOD DE ACȚIUNE

- Inhibă eliberarea zoosporilor din sporangiu;
- Inhibă creșterea intercelulară a hifelor;
- Patogenul nu se răspândește în plantă;
- Planta reacționează rapid prin hipersensibilizare;
- Determină moartea hifelor intercelulare și a haustoriilor pătrunși în celule;
- Inhibă sporularea parazitului.

## TRATAMENT CURATIV ȘI PREVENTIV




### LEGENDĂ

- ★ Curzate
- Folpet

## MOD DE UTILIZARE

- Se aplică la vița de vie pentru combaterea manei (*Plasmopara viticola*) doza de 2,5 l/ha (250 ml/100 l apă);
- Se aplică preventiv la apariția riscului de infecție;
- Acțiunea curativă este de scurtă durată după infecție. Respectați recomandările serviciului de prognoză și avertizare;
- Este necesar un volum de apă, adaptat pentru a asigura un grad de acoperire ridicat printr-o stropire uniformă;
- În caz de presiune de infecție ridicată, tratamentul se repetă la interval de 8-12 zile;
- Se recomandă până la 4 tratamente/sezon.



Efectul sinergic al celor două substanțe active din compoziția fungicidului Curzate® F are drept rezultat un control eficient al bolii.

## TIMP DE PAUZĂ

- Intervalul de timp de la ultima aplicare până la recoltare este de 14 zile la strugurii de masă și de 35 zile la strugurii de vin.

FUNGICIDE

Extra protecție.  
Extra profit.  
Contați pe DuPont.

S.C Vin Club SRL  
Odobești, jud. Vrancea  
Director Savian Florea

“Suntem prima asociație a podgorenilor din România, înființată în anul 2000. Proprietari a peste 160 ha vie în podgoriile Cotești și Odobești. Vinificăm și comercializăm în crama comună a SC Vin Club S.R.L. vinurile din strugurii produși de noi în viile proprii. Am folosit în decursul anilor și am fost foarte mulțumiți de produsele Curzate® F și Kocide® 2000 ale firmei DuPont™. În anii următori vom folosi și produsele Equation® Pro, Fanion®, Manzate® și Talendo®.”

