

DuPont™ Fanion® WG

Fungicid sistemic local pentru combaterea manei la vița de vie, cartof și tomate

Conține: 4,8% cimoxanil + 20% folpet + 20% mancozeb.
Formulare: granule dispersabile. Ambalat la 1 kg.

AVANTAJE

- Afectează o serie de funcții vitale ale paraziților și nu induce rezistență;
- Combate biotipurile de patogeni rezistente;
- Partener de amestec cu un număr mare de fungicide;
- Efect sinergic al substanțelor active componente;
- Lipsa poluării mediului și lipsa reziduurilor în culturile tratate (fructe, legume, sucuri, vin, etc.);
- Nu afectează fermentația vinului;

MOD DE ACȚIUNE


- Cimoxanil - partener de drum lung, este omologat în România din anul 1978 la vița de vie și cartof, din 1979 la tomate și ceapă și din 1980 la castraveți și hamei. Este utilizat pe plan mondial din anul 1976 fără să inducă rezistență în populația paraziților, în timp ce la alte produse au apărut sușe rezistente încă din anul 1980;
- Acțiune sistemic locală și de contact;
- Activ împotriva biotipurilor rezistente de patogeni;
- Inhibă sporularea parazitului;
- Reduce răspândirea patogenilor în natură;



ACȚIUNE PREVENTIVĂ, CURATIVĂ ȘI ANTISPORULANTĂ ÎNTR-O COMBINAȚIE UNICĂ!

ACȚIUNEA FANION®WG ASUPRA CIUPERCILOR PARAZITE

FUNGICIDE



**Fanion® WG acționează în toate stadiile de dezvoltare a agentului patogen
Fanion® WG stimulează procesele naturale de apărare ale plantei**

Fanion®

COMPLEMENTARITATEA CELOR TREI SUBSTANȚE ACTIVE

	Cimoxanil	Mancozeb	Folpet
Mod de acțiune	Penetrant sistemic local Preventiv Curativ Antisporulant	Contact Preventiv	Contact Preventiv
Activitate	Mană, Alternaria	Mană, Alternaria	Mană, Alternaria
Persistența în plantă	Nu este spălat	Persistență bună	Persistență bună
Calitate	Absența reziduurilor	Absența reziduurilor	Absența reziduurilor

MOD DE UTILIZARE

- Vița de vie: combate mana (*Plasmopara viticola*) la doza de 2,5 kg/ha - volumul de soluție 500-1000 l;
- Cartof: combate mana (*Phytophthora infestans*) și alternaria (*Alternaria spp*) la doza de 2,5 kg/ha; 200-400 l/ha apă volumul de soluție;
- Tomate: combate mana (*Phytophthora infestans*) la doza de 2,5 kg/ha;
- Volumul de soluție 200-1000 l/ha;
- Se aplică preventiv la apariția riscului de infecție. Acțiunea curativă este de scurtă durată după infecție. Respectați recomandările serviciului de prognoză și avertizare;
- În caz de presiune de infecție mare tratamentul se repetă la interval de 7-8 zile. Numărul de tratamente recomandat este de maxim 4/sezon.

TIMP DE PAUZĂ

- Intervalul de timp de la ultima aplicare până la recoltare este de 14 zile la strugurii de masă, 35 zile la stugurii de vin, 14 zile la cartof și 7 zile la tomate.

PĂSTREAZĂ IDENTITATEA VINULUI!

- Nu are efect asupra proceselor de fermentare;
- Nu are efect asupra proprietăților organoleptice;
- Nu lasă reziduuri în vin.

