

DuPont™ Granstar® 75 DF

Erbicid selectiv pentru cereale păioase
în combaterea buruienilor cu frunză lată

Conține: 75% tribenuron metil.

Formulare: granule dispersabile. Ambalat la 8 g, 100 g și 1 kg.

ERBICIDE

AVANTAJE

- Granstar® asigură o excelentă combatere a buruienilor cu frunză lată;
- Granstar® combate un spectru larg de buruieni, inclusiv buruieni dificil de combătut ca pălămida, loboda etc.;
- Granstar® este un produs deosebit de selectiv și poate fi utilizat pe orice cultură de cereale păioase, fără restricții pentru culturile ce urmează în rotație;
- Granstar® are o perioadă lungă de aplicare - de la stadiul de 3 frunze, până la apariția completă a frunzei standard;
- Eficacitatea erbicidului depinde de mărimea buruienilor ce trebuie combătute;
- Granstar® poate fi amestecat cu alte erbicide, mărindu-se astfel spectrul de combatere.

MOD DE ACȚIUNE

- Granstar® este absorbit rapid în principal prin frunze dar și prin rădăcini, deși activitatea acestuia în sol este foarte scurtă. 3-4 ore fără ploaie sunt suficiente pentru ca produsul să fie absorbit de către plante;
- Granstar® este un erbicid sistemic, care inhibă diviziunea celulară în rădăcini, vârfurile apicale de creștere și mugurii axiali, oprind imediat dezvoltarea acestora;
- În culturile erbicidate, buruienile nu mai afectează producția și nu mai pot concura cu plantele de cultură pentru apă și substanțe nutritive. După câteva zile de la tratament buruienile se îngălbenesc și/sau înroșesc după care mor în câteva săptămâni;
- Buruienile care nu sunt sensibile sunt oprite din creștere și nu mai pot concura plantele de cultură;
- Granstar® este metabolizat rapid de către cerealele tratate, fără reziduuri în pai sau bob.

MOD DE UTILIZARE

- Granstar® se utilizează în tratamente postemergente, din faza de trei frunze ale cerealelor, până la faza de burduf. Pentru o bună combatere Granstar® trebuie aplicat când buruienile sunt în primele faze de dezvoltare, perioada optimă fiind în stadiul de rozetă, dar și buruienile în faze mai avansate de dezvoltare sunt combătute;
- Granstar® este omologat la următoarele culturi și doze:

Grâu	postemergent - doza: 15-20gr/ha
Orz	postemergent - doza: 10-15gr/ha

Înainte oricărei utilizări, citiți cu atenție eticheta care însoțește produsul
© este marcă înregistrată a companiei DuPont de Nemours
Granstar® 75 DF este omologat cu certificat nr. 1193 / 1991



The miracles of science™

Granstar®

Doza de Granstar® administrată depinde de sensibilitatea buruienilor, stadiul de dezvoltare și condițiile de creștere

COMBATerea UNOR BURUIENI PROBLEMĂ

- Pentru obținerea unei combateri eficiente, aplicarea erbicidului trebuie efectuată când buruienile *Cirsium* și *Helianthus* au între 10 și 15 cm înălțime.
- Pentru combaterea samulastrei rezistentă Express® se recomandă amestecul cu 2,4 D, dicamba, fluroxipir, MCPP.
- Aplicarea combinată (tank mix) cu Cerlit™ - 400 ml/ha - reprezintă combaterea cea mai eficientă a buruienii, fără efecte fitotoxice sau remanență.

SISTEM DE
AUTENTIFICARE
A CALITĂȚII
DUPONT



- În următoarele situații se recomandă adăugarea unui surfactant non ionic (Trend®):
 - Când buruienile sunt în faze avansate de dezvoltare (Trend® - 250 ml/ha) pentru buruieni dificil de umectat.
 - În caz de vreme secetoasă și pentru buruieni dificil de umectat

ERBICIDE



Granstar®

SPECTRUL DE BURUIENI COMBĂTUTE

ERBICIDE

BURUIENI SENSIBILE

Albăstrița (*Centaurea cyanus*)
Ciocul berzei (*Geranium spp.*)
Lobodă albă (*Chenopodium spp.*)
Lungurică (*Galeopsis tetrahit*)
Mac sălbatic (*Papaver rhoeas*)
Măcriș (*Rumex crispus*)
Mei pășăresc (*Lithospermum arvense*)
Mușețel (*Matricaria chamomilla*)
Muștar sălbatic (*Sinapis arvensis*)
Nu-mă-uita (*Myosotis arvensis*)
Pălămidă (*Cirsium arvense*)
Păpădia (*Taraxacum officinale*)
Piciorul cocoșului (*Ranunculus spp.*)
Pucioasă (*Bifora radians*)
Punguliță (*Thlapsi arvenses*)
Rocoină (*Stellaria media*)
Romaniță de câmp (*Anthemis arvensis*)
Rușcuță primăvărată (*Adonis vernalis*)
Samulastră de fl soarelui (*Helianthus annuus*)

BURUIENI SENSIBILE

Samulastră de lucernă (*Medicago sativa*)
Struna cocoșului (*Cerastium arvense*)
Sânziene (*Galium rotundifolium*)
Spălăcioasă (*Senecio vulgaris*)
Susai (*Sonchus arvensis*)
Știr (*Amaranthus retroflexus*)
Talpa găștei (*Atriplex spp.*)
Traista ciobanului (*Capsella bursa pastoris*)
Troscot (*Polygonum aviculare*)
Urzică moartă (*Urtica urens*)
Zărnă (*Solanum nigrum*)

BURUIENI MEDIU COMBĂTUTE

Doritoare (*Veronica spp.*)
Hrișcă urcătoare (*Polygonum convolvulus*)
Trei frați pătați (*Viola tricolor*)
Turița (*Galium aparine*)

BURUIENI REZISTENTE

Fumărița (*Fumaria officinalis*)
Volbură (*Convolvulus arvensis*)

Extra protecție.
Extra profit.
Contați pe DuPont.

S.C. Agro Dăneasa SA
Dăneasa, Jud. Olt
Administrator Naidin Daniel

"Anul acesta am folosit produsul **Granstar® 75 DF** pentru a controla buruienile dicotiledonate din culturile de cereale păioase, pe o suprafață de 880 ha, cu rezultate foarte bune. În trecut am folosit și alte produse pentru controlul acestora dar rezultatele obținute cu **Granstar® 75 DF** sunt net superioare. Pe lângă erbicidele pentru cerealele păioase am fost foarte mulțumit și de fungicidele **Alert®** și **Acanto® Plus**. Voi utiliza în continuare produsele **DuPont®** și recomand și altor fermieri, care doresc să aibă culturi sănătoase și curate de buruieni, să le folosească cu încredere."

