

Erbicid pentru cereale păioase cu spectru larg  
în combaterea buruienilor cu frunză lată

Conține: 25 % tifensulfuron-metil și 25 % tribenuron-metil.  
Formulare: granule solubile. Ambalat la 40 g și 200 g.

## AVANTAJE

- Granstar® Super combate un spectru larg de buruieni cu frunză lată inclusiv cele problemă precum pălămida, muștarul sălbatic, scaieții, loboda, rocoina, pungulița, iarba roșie, zămoșița, etc. Spectrul de combatere acoperă peste 70 specii de buruieni.
- Granstar® Super este selectiv pentru cerealele păioase, fără implicații asupra recoltei;
- Granstar® Super se poate aplica până la apariția completă a frunzei standard;
- Granstar® Super combate buruienile perene și reduce sursa de îmburuienare pentru culturile ce urmează în rotație;
- Granstar® Super poate fi folosit la temperaturi peste 5 grade Celsius;
- Granstar® Super îmbunătățește dispersia substanței active în soluția de stropit
- Reduce reziduurile de pe pereții rezervorului, numărul de spălări, cantitatea de apă necesară spălării asigurând astfel eficacitatea produsului.

## MOD DE ACȚIUNE

- Granstar® Super este un erbicid sistemic selectiv, absorbit prin frunze dar și prin rădăcini, care oprește rapid creșterea buruienilor sensibile.
- Granstar® Super acționează asupra buruienilor inhibând diviziunea celulară în rădăcini, în vârfurile de creștere și mugurii axiali, oprind creșterea și dezvoltarea acestora în câteva ore de la aplicare.
- După câteva zile de la tratament, buruienile se îngălbenesc sau înroșesc, se necrozează și mor, în 2-3 săptămâni de la aplicare.
- Două ore fără ploaie sunt suficiente pentru ca produsul să fie absorbit de către plante fără să fie spălat.

## MOD DE UTILIZARE

- Granstar® Super se utilizează în postemergență la cerealele păioase în primăvară de la înfrățit până la apariția frunzei standard.
- Momentul optim de aplicare este în perioada de creștere activă a buruienilor, respectiv din faza de cotiledoane până la maxim 6 frunze adevărate.

<b>Grâu:</b>	<b>postemergent - doză: 40gr/ha</b>
<b>Volumul de apă:</b>	<b>200- 400 l/ha</b>
<b>Număr de tratamente:</b>	<b>1/an.</b>

# Granstar®

## RECOMANDĂRI

- În condiții de deficit hidric în sol și/sau atmosferă se recomandă utilizarea adjuvantului Trend® în doza de 250 ml/ha.
- Pentru o combatere superioară a pălămidei aplicarea erbicidului se face când buruiiana are maxim 10-15 cm înălțime (rozetă cu 4-6 frunze). Pentru lărgirea spectrului de buruieni cu frunză lată combătute, Granstar® Super se poate amesteca în rezervorul mașinii cu erbicide pe bază de 2,4D, dicamba, bromoxinil sau fluroxipir.
- Granstar® Super asigură o combatere bună a turiței (*Galium aparine*) dacă este aplicat în faza de 2-3 verticilii. Pentru o combatere superioară a turiței la infestări puternice sau aflată în faze avansate de creștere se recomandă amestecul produsului cu Cerlit™ în doză de 400 ml/ha.
- Curăță terenul pentru culturile următoare din cadrul rotației (cartof, sfeclă sau floarea soarelui) la care combaterea buruienilor cu frunză lată este dificilă.

SISTEM DE  
AUTENTIFICARE  
A CALITĂȚII  
DUPONT



- Fără restricții pentru culturile care urmează în rotație (rașiță, culturi succesive de porumb și soia).
- În caz de compromiterea culturilor de cereale tratate cu Granstar® Super, indiferent de cauză, se pot resemăna numai cereale de primăvară (grâu, ovăz, orzoaică) după arătură adâncă.

ERBICIDE



The miracles of science™

# Granstar®

## SPECTRUL DE BURUIENI COMBĂTUTE

### BURUIENI SENSIBILE (2-4 frunze)

Ardeii broastei (*Polygonum persicaria*)  
Dragavei (*Rumex crispus*)  
Grașiță (*Portulaca oleracea*)  
Hrana vacii (*Spergula arvensis*)  
Loboda albă (*Chenopodium album*)  
Lobodă sălbatică (*Atriplex patula*)  
Lungurică (*Galeopsis tetrahit*)  
Mac roșu (*Papaver rhoeas*)  
Măcrișul calului (*Rumex obtusifolius*)  
Mușețel sălbatic (*Matricaria inodora*)  
Muștar negru (*Brassica nigra*)  
Muștar sălbatic (*Sinapis arvensis*)  
Palamida (*Cirsium arvense*)  
Punguliță (*Thlaspi arvense*)  
Ridiche sălbatică (*Raphanus raphanistrum*)  
Rocoină (*Stellaria media*)  
Romanița (*Anthemis spp.*)  
Samulastră de floarea soarelui (*Helianthus annuus*)  
Samulastră de rapiță (*Brassica oleracea*)

### BURUIENI SENSIBILE

Sugel (*Lamium spp.*)  
Știr sălbatic (*Amaranthus retroflexus*)  
Teișor (*Abutilon theophrasti*)  
Traista ciobanului (*Capsella bursa-pastoris*)  
Zămoșiță (*Hibiscus trionum*)

### BURUIENI MEDIU COMBĂTUTE

Cornaci (*Xanthium italicum*)  
Iarbă roșie (*Polygonum lapathifolium*)  
Turiță (*Galium aparine*)  
Trei frați pătați (*Viola arvensis*)  
Troscot (*Polygonum aviculare*)

### BURUIENI REZISTENTE

Doritoare (*Veronica hederifolia*)  
Fumărita (*Fumaria officinalis*)  
Holera (*Xanthium spinosum*)  
Rochița rândunicii (*Convolvulus arvensis*)

ERBICIDE

Extra protecție.  
Extra profit.  
Contați pe DuPont.

S.C. CIT Santău SRL  
Santău, Jud. Satu Mare  
Administrator Lucaci Alexandru

" An de an cultiv aproximativ 300 ha cu grâu, obținând rezultate excelente utilizând produsele DuPont™ iar începând cu anul 2010 folosesc cu încredere și erbicidul Granstar® Super în combaterea buruienilor cu frunză lată. Voi introduce și pe viitor erbicidul Granstar® Super în schemele de tratament la cereale păioase pentru siguranța unor culturi și recolte sănătoase. Utilizarea produselor DuPont™ mi-a adus întotdeauna multe satisfacții și realizări și le recomand cu încredere și celorlalți fermieri."

