

DuPont™ Tanos® 50 WG

Fungicid complex, cu spectru larg
în combaterea bolilor la floarea soarelui

Conține: 250 g/kg famoxadon + 250 g/kg cimoxanil.
Formulare: granule dispersabile. Ambalat la 1kg.


AVANTAJE

- Protecție preventivă și curativă bună împotriva bolilor problemă;
- Rezistență foarte bună la spălare după 1-2 ore de la aplicare;
- Rămâne mult timp activ pe suprafața foliară;
- Amestec "anti rezistență" prin modul de acțiune diferit al celor două substanțe active;
- Reactivarea produsului prin rouă, ploaie sau irigare;
- Menține cultura verde mai mult timp;
- Spor cantitativ și calitativ de producție.

MOD DE ACȚIUNE

- Tanos® 50 WG are efect preventiv și curativ. Tanos® 50 WG conține două substanțe active cu mod multiplu de acțiune;
- Prin acțiunea lui blochează la nivelul mitocondriilor producerea de energie și respirația celulelor, necesare dezvoltării ciupercii;
- Famoxadonul are proprietăți lipoflice fiind aderent la cuticulă și foarte greu de spălat după 1 oră de la aplicare. Are acțiune antisporulantă și blochează creșterea ciupercii;
- Famoxadonul difuzează în cuticulă și determină o bună redistribuire a substanței active la suprafața frunzei fiind remobilizat prin ploaie și rouă. Sporii ciupercii devin incapabili să încolțească, germinarea sporilor fiind blocată;
- Cimoxanilul penetrează țesutul frunzei și se distribuie translaminar. Stopează creșterea leziunilor și sporularea, inducând reacția de autoapărare a plantei.

SECȚIUNE PRIN FRUNZĂ



MOD DE UTILIZARE


Tanos® 50 WG este omologat pentru controlul bolilor la floarea soarelui

| Cultura | Boala | Doza |
|--------------------|---|-----------|
| Floarea - soarelui | Putregai alb (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) Putregai cenușiu (<i>Botrytis cinerea</i>) Alternarioza (<i>Alternaria spp</i>) Necrozarea și frângerea tulpinilor (<i>Phomopsis helianthi</i>) Mana (<i>Plasmopara helianthi</i>) | 0,4 kg/Ha |

FUNGICIDE

- Pentru a obține producții ridicate, de calitate și maximum de eficacitate al fungicidului se recomandă utilizarea lui Tanos® la al II-lea tratament în faza de buton floral-îmbobocire;
- Tehnologiile performante bazate pe două tratamente presupun aplicarea primului tratament în faza de 6-8 frunze (Acanto® Plus) pentru bolile la tulpină și frunze și tratamentul al II-lea la îmbobocire (Tanos® 0,4 kg/ha) pentru protejarea calatidiului.
- În cazuri excepționale de atac de mană (*Plasmopara helianthi*), aplicați 2 tratamente succesive la un interval de 7-10 zile imediat ce depistați atacul.

EFICACITATEA LUI TANOS® ÎN CONTROLUL BOLILOR



Martor



Tratat cu Tanos® 0,4 kg/ha